Afrikansk blåregn

Bolusanthus speciosus

Billede følger
Bolusanthus speciosus

Kort fortalt

- *Bolusanthus speciosus* – ærteblomstfamilien (Fabaceae), eneste art i sin slægt.
- Hjemmehørende i det sydlige Afrika, fra Angola og Zambia til Sydafrika.
- Duftende, blåviolette blomsterklaser om foråret, før eller samtidig med de nye blade.
- Vokser hurtigt og tåler tidlig formbeskæring.
- Om sommeren ude i fuld sol, om vinteren lyst og frostfrit inde.
- Frøene ridses let med sandpapir og lægges i blød i 24 timer før såning.
- Spirer efter 1–5 uger ved varme; kan sås inde hele året.

Det kan du se frem til

Med frøene af afrikansk blåregn har du grundlaget for et hurtigtvoksende træ, som du selv former fra den første spire. De første kimplanter viser sig typisk efter 1–5 uger, og allerede i den første sæson kan du begynde formbeskæringen. De duftende, blåviolette blomsterklaser kommer først, når træet er nogle år gammelt – indtil da er det dig, der bestemmer formen.

Mange forbinder bonsai med et færdigt lille træ fra butikken. Med frø starter du et skridt tidligere – og det giver dig noget, et købt træ aldrig kan: Du bestemmer selv formen fra den første spire, og du kan dyrke arter, der sjældent eller aldrig sælges som færdige bonsai. Det kræver tålmodighed, for der går nogle år, før frøplanten er blevet til et egentligt bonsaitræ. Til gengæld er træet dit eget fra start til slut. Herunder finder du det, du skal vide for at komme godt fra start med netop denne art.

Introduktion

Afrikansk blåregn (*Bolusanthus speciosus*) er et lille, kortvarigt løvfældende træ fra ærteblomstfamilien og den eneste art i sin slægt. Det vokser naturligt på savanner med spredte træer i det sydlige Afrika, fra Angola og Zambia ned til det nordøstlige Sydafrika. I hjemlandet bliver træet normalt 4–7 meter højt og vokser opret og slankt med let hængende grene. Om foråret, før eller samtidig med at de nye blade kommer frem, bærer det hængende klaser af duftende, blåviolette ærteblomster, der minder om blåregn. Bladene er finnede og blanke grønne. Arten vokser hurtigt, og det gør den velegnet til bonsai, fordi formen kan bygges op tidligt.

Formering

Frøene kan sås inde hele året. Frøskallen er hård og optager kun langsomt vand. Ru derfor frøene let op med fint sandpapir, og læg dem i vand i ca. 24 timer. Så dem ca. 1 cm dybt i fugtig såjord eller kokos-såmuld med ca. 5 cm afstand. Et lunt sted begynder spiringen normalt efter 1–5 uger. Hold dyrkningsmediet jævnt fugtigt, men ikke vådt. Når kimplanterne har fået de første rigtige blade, prikles de ud i enkelte potter med priklejord.

Placering og lys

Afrikansk blåregn vokser bedst i fuld sol. Kun unge planter har det bedre i let halvskygge. Fra maj til september kan træet stå ude et solrigt og lunt sted, når der ikke længere er risiko for nattefrost. Jo varmere det står, jo kraftigere vokser det.

Sikkerhed: Frø, næringsstoffer og dyrkningsmedier er ikke beregnet til at spise – hverken for mennesker eller dyr. Nogle arter er giftige, så opbevar dem utilgængeligt for børn og dyr.

Vanding og næringsstoffer

Hold dyrkningsmediet jævnt fugtigt, og undgå både udtørring og stående vand. Det er en fordel at overbruse bladene en gang imellem – helst med rent regnvand i stuetemperatur, så der ikke kommer kalkpletter. Fra marts til september gives flydende bonsai-næring hver 4. uge. Langtidsvirkende næring bør først bruges til ældre træer.

Dyrkningsmedie

Brug en luftig, veldrænet blanding: almindelig potteplantejord tilsat ca. en fjerdedel groft sand eller færdig bonsai-jord. Til unge planter passer priklejord med kvartssand. Ældre træer omplantes i bonsai-jord.

Beskæring

Vent med at beskære, til blomstringen er overstået. Lad et nyt skud danne 4–5 blade, og skær det derefter tilbage til 2–3 blade. Unge planter, der endnu ikke blomstrer, kan beskæres løbende i hele vækstsæsonen. Da træet vokser hurtigt, er det en fordel at begynde formbeskæringen tidligt.

Vinteropbevaring

Ældre træer, der står i jorden i hjemlandet, tåler let frost. En bonsai i skål og især unge planter skal dog overvintre frostfrit. Tag træet ind, før nattetemperaturen falder under ca. 5 °C, og stil det lyst ved ca. 10–15 °C. Vand sparsomt, så dyrkningsmediet ikke tørrer helt ud, og giv ingen næring. Det er normalt, at træet i en kort periode taber en del af bladene. Fra maj kan det igen stå ude.

Vigtige dyrkningstips

Det meste, der går galt ved såning, skyldes for meget vand eller for lidt lys. Jeg anbefaler et let, næringsfattigt såmedie som såjord eller kokos-såmuld, så de fine rødder ikke rådner. Når kimplanterne skal prikles, giver priklejord med kvartssand god dræning og et stabilt rodnet. Senere, når træet skal formes som bonsai, er min færdigblandede bonsai-jord et godt grundlag. Hav tålmodighed: Frø fra samme pose spirer ikke altid samtidig, så lad såbakken stå, selvom de første kimplanter allerede er kommet op.