Indisk krepmyrte

Lagerstroemia indica



Kort fortalt

- *Lagerstroemia indica* – kattehalefamilien (Lythraceae).
- Hjemmehørende fra Himalaya til Sydkina og Indokina; dyrket i Kina i over 1600 år.
- Kreppede, krusede blomster i store toppe fra juli til september.
- Glat, plettet bark; små elliptiske blade, der falder om efteråret.
- Om sommeren ude i fuld sol, om vinteren koldt og frostfrit.
- Frøene spirer bedst ved 20–24 °C og dækkes kun tyndt.
- Blomsterfarven fra frø varierer – fra hvid og lyserød til lilla.

Det kan du se frem til

Med frøene af indisk krepmyrte har du grundlaget for et lille, blomstrende løvtræ, som du selv former fra den første spire. Krepmyrten vokser villigt og forveddes hurtigt, så du kan begynde at forme den tidligt. Hvilken farve blomsterne får, er en del af spændingen: Planter fra frø kan blomstre hvidt, lyserødt eller lilla.

Mange forbinder bonsai med et færdigt lille træ fra butikken. Med frø starter du et skridt tidligere – og det giver dig noget, et købt træ aldrig kan: Du bestemmer selv formen fra den første spire, og du kan dyrke arter, der sjældent eller aldrig sælges som færdige bonsai. Det kræver tålmodighed, for der går nogle år, før frøplanten er blevet til et egentligt bonsaitræ. Til gengæld er træet dit eget fra start til slut. Herunder finder du det, du skal vide for at komme godt fra start med netop denne art.

Introduktion

Indisk krepmyrte (*Lagerstroemia indica*) er en løvfældende busk eller et lille træ fra kattehalefamilien. Trods navnet stammer den ikke fra Indien: Den vokser naturligt fra Himalaya til Sydkina og Indokina, og i Kina har den været dyrket i mere end 1600 år. Slægtsnavnet hædrer Magnus von Lagerström, direktør i det Svenske Ostindiske Kompagni og ven af Linné. Fra juli til september bærer krepmyrten store toppe af kreppede, krusede blomster. Bladene er små og elliptiske, og barken er glat og plettet. Arten er i dag populær i hele Middelhavsområdet. Den vokser villigt og forveddes hurtigt, så den tidligt kan formes til en bonsai.

Formering

Frøene spirer bedst ved en jordtemperatur på 20–24 °C. Strø dem på fugtig såjord eller kokos-såmuld, dæk dem kun tyndt, og tryk let. Hold dyrkningsmediet let fugtigt, indtil frøene er spiret. Planter fra frø får ikke altid samme blomsterfarve som moderplanten – blomsterne kan blive hvide, lyserøde, lilla eller mørkerøde. Når kimplanterne har fået de første rigtige blade, prikles de ud i enkelte potter med priklejord.

Placering og lys

Krepmyrten vil have det solrigt, varmt og luftigt. Fra slutningen af maj til begyndelsen af oktober står den bedst ude. Den har brug for en kølig vinterhvile og egner sig derfor ikke til at stå i stuen hele året.

Sikkerhed: Frø, næringsstoffer og dyrkningsmedier er ikke beregnet til at spise – hverken for mennesker eller dyr. Nogle arter er giftige, så opbevar dem utilgængeligt for børn og dyr.

Vanding og næringsstoffer

Fra forår til sommer vandes rigeligt, men lad overfladen tørre let mellem vandingerne. Lige før blomsterknopperne dannes, kan du vande lidt mindre – det fremmer blomstringen. Fra april til og med september gives bonsai-næring ca. hver 3. uge; om vinteren gives ingen næring.

Dyrkningsmedie

Færdigblandet bonsai-jord er et godt valg. Du kan også blande 1 del lerjord, 2 dele organisk materiale og 1 del sand. Til unge planter passer priklejord med kvartssand.

Beskæring

Lad hvert nyt skud danne 6 blade, og skær det derefter tilbage til 1–2 blade. Regelmæssig beskæring giver en tæt og fin forgrening. Blomsterne sidder i spidsen af årets skud, så ældre træer, der skal blomstre, beskæres kun om efteråret efter blomstringen.

Vinteropbevaring

Krepmyrten er løvfældende og har brug for en kølig hvileperiode. I haven tåler arten en del frost, men i en skål er rødderne langt mere udsatte. Lad træet stå ude i efteråret, så længe der højst er let nattefrost – kulden sender det i hvile, og bladene falder. Før det for alvor fryser, flyttes det til et koldt, frostfrit sted ved ca. 2–10 °C, fx et uopvarmet rum, en kold kælder eller en frostfri garage; når bladene er faldet, behøver træet ikke lys. Vand sparsomt, så dyrkningsmediet ikke tørrer helt ud, og giv ingen næring. Når knopperne begynder at svulme om foråret, skal træet stå lyst igen, og fra midten af maj kan det komme ud.

Vigtige dyrkningstips

Det meste, der går galt ved såning, skyldes for meget vand eller for lidt lys. Jeg anbefaler et let, næringsfattigt sådmedie som såjord eller kokos-såmuld, så de fine rødder ikke rådner. Når kimplanterne skal prikles, giver priklejord med kvartssand god dræning og et stabilt rodnet. Senere, når træet skal formes som bonsai, er min færdigblandede bonsai-jord et godt grundlag. Hav tålmodighed: Frø fra samme pose spirer ikke altid samtidig, så lad såbakken stå, selvom de første kimplanter allerede er kommet op.