Kanarisk buskmargerit

Argyranthemum foeniculaceum



Kort fortalt

- *Argyranthemum foeniculaceum* – kurvblomstfamilien (Asteraceae).
- Vokser vildt kun på Tenerife, i sprækker på tørre klipper.
- Stedsegrøn halvbusk med fintdelte, blågrønne blade; bliver hurtigt træagtig ved grunden.
- Hvide margeritblomster med gul midte fra forår til efterår.
- Ude om sommeren i fuld sol; inde om vinteren lyst og køligt ved ca. 5–10 °C.
- Regnes som giftig for hunde, katte og heste – opbevares utilgængeligt for dyr og børn.
- Frøene dækkes kun meget tyndt og spirer efter 8–15 dage ved stuetemperatur.

Det kan du se frem til

Med frøene af kanarisk buskmargerit har du grundlaget for en lille, blomstrende bonsai, som du selv former fra den første spire. De første kimplanter viser sig typisk efter 8–15 dage. Planten vokser hurtigt, og stammen bliver tidligt træagtig, så du kan begynde at forme den allerede det første år. De hvide margeritblomster kan komme allerede i den første sommer.

Mange forbinder bonsai med et færdigt lille træ fra butikken. Med frø starter du et skridt tidligere – og det giver dig noget, et købt træ aldrig kan: Du bestemmer selv formen fra den første spire, og du kan dyrke arter, der sjældent eller aldrig sælges som færdige bonsai. Det kræver tålmodighed, for der går nogle år, før frøplanten er blevet til et egentligt bonsaitræ. Til gengæld er træet dit eget fra start til slut. Herunder finder du det, du skal vide for at komme godt fra start med netop denne art.

Introduktion

Kanarisk buskmargerit (*Argyranthemum foeniculaceum*) er en stedsegrøn halvbusk fra kurvblomstfamilien. Den vokser vildt kun på Tenerife på De Kanariske Øer, hvor den sidder i sprækker på tørre basaltklipper i 200–1.100 meters højde. I naturen bliver den 50–100 cm høj. Bladene er fint fligede og blågrønne – artsnavnet foeniculaceum betyder „fennikelagtig". Fra forår til efterår bærer planten hvide margeritblomster med gul midte. Den vokser hurtigt, og stammen bliver tidligt træagtig, så den kan formes som en lille, blomstrende bonsai; den lever dog ikke så længe som et egentligt træ. Som andre margeritter regnes planten som giftig for hunde, katte og heste og bør stå, hvor dyr og børn ikke kan komme til den.

Formering

Frøene kan sås inde hele året; bedst sidst på vinteren eller om foråret. Strø de fine frø ud på fugtig såjord eller kokos-såmuld, tryk dem let ned, og dæk dem kun med et meget tyndt lag. Hold dyrkningsmediet jævnt fugtigt, men ikke vådt. Ved stuetemperatur spirer frøene normalt efter 8–15 dage; ikke alle frø spirer. Når kimplanterne har fået de første rigtige blade, prikles de ud i enkelte potter med priklejord.

Placering og lys

Kanarisk buskmargerit vil have lyst og gerne fuld sol. Fra slutningen af maj, når der ikke længere er risiko for nattefrost, til oktober står den bedst ude et solrigt sted. Står den for mørkt, bliver skuddene lange og bløde, og der kommer færre blomster.

Sikkerhed: Frø, næringsstoffer og dyrkningsmedier er ikke beregnet til at spise – hverken for mennesker eller dyr. Nogle arter er giftige, så opbevar dem utilgængeligt for børn og dyr.

Vanding og næringsstoffer

Om sommeren bruger planten meget vand: Vand grundigt, så snart overfladen er tør, men undgå stående vand. Overbrus en gang imellem med rent regnvand i stuetemperatur. Fra april til september gives flydende bonsai-næring hver 2. uge – den lange blomstring kræver næring. Om vinteren vandes kun lidt.

Dyrkningsmedie

Brug et veldrænet dyrkningsmedie; færdig bonsai-jord er et godt grundlag. Til unge planter passer priklejord med kvartssand. Da planten vokser hurtigt, omplantes unge planter hvert år om foråret.

Beskæring

Klip de afblomstrede stilke af løbende – så kommer der hurtigt nye blomster. Om foråret skæres planten kraftigt tilbage, så den forgrener sig tæt; den skyder villigt igen. Små skud direkte på stammen kan fjernes, så stammen og etagerne træder tydeligt frem.

Vinteropbevaring

Kanarisk buskmargerit tåler kun let frost, og i en skål skal den overvintre frostfrit. Tag den ind, før det fryser, og stil den lyst og køligt ved ca. 5–10 °C – fx i et uopvarmet, lyst rum eller en kold vinterhave. I en varm stue bliver skuddene svage, og der kommer let skadedyr. Vand sparsomt, men lad aldrig rodklumpen tørre helt ud, og giv ingen næring. Fra slutningen af maj kan den igen stå ude.

Vigtige dyrkningstips

Det meste, der går galt ved såning, skyldes for meget vand eller for lidt lys. Jeg anbefaler et let, næringsfattigt såmedie som såjord eller kokos-såmuld, så de fine rødder ikke rådner. Når kimplanterne skal prikles, giver priklejord med kvartssand god dræning og et stabilt rodnet. Senere, når træet skal formes som bonsai, er min færdigblandede bonsai-jord et godt grundlag. Hav tålmodighed: Frø fra samme pose spirer ikke altid samtidig, så lad såbakken stå, selvom de første kimplanter allerede er kommet op.