Australsk buskkirsebær

Syzygium paniculatum



Kort fortalt

- *Syzygium paniculatum (syn. Eugenia paniculata)* – myrtefamilien (Myrtaceae).
- Hjemmehørende på en smal kyststrækning i New South Wales i det østlige Australien.
- Stedsegrønt træ med små, blanke blade; de nye skud er rødlige til kobberrøde.
- Hvide blomster med mange støvdragere om sommeren; bagefter purpurrøde, ægformede frugter.
- Om sommeren ude, om vinteren lyst og frostfrit inde ved ca. 10–15 °C.
- Tåler beskæring godt og kan beskæres hele året.
- Frøene lægges i blød natten over; ét frø kan give flere kimplanter.

Det kan du se frem til

Med frøene af australsk buskkirsebær har du grundlaget for en stedsegrøn bonsai med små, blanke blade og rødlige skud, som du selv former fra den første spire. Kimplanterne viser sig typisk efter nogle uger – og nogle gange kommer der flere op af samme frø. Træet vokser kraftigt og tåler beskæring godt, så formen kan bygges op i et roligt tempo år for år. Hvide blomster og purpurrøde frugter kommer, når planten er blevet ældre.

Mange forbinder bonsai med et færdigt lille træ fra butikken. Med frø starter du et skridt tidligere – og det giver dig noget, et købt træ aldrig kan: Du bestemmer selv formen fra den første spire, og du kan dyrke arter, der sjældent eller aldrig sælges som færdige bonsai. Det kræver tålmodighed, for der går nogle år, før frøplanten er blevet til et egentligt bonsaitræ. Til gengæld er træet dit eget fra start til slut. Herunder finder du det, du skal vide for at komme godt fra start med netop denne art.

Introduktion

Australsk buskkirsebær (*Syzygium paniculatum*) er et stedsegrønt træ fra myrtefamilien; i handlen går det ofte under det ældre navn Eugenia. Det er hjemmehørende på en smal kyststrækning i New South Wales i det østlige Australien, hvor det vokser i kystnær regnskov, og det regnes i dag som sårbart i naturen. Bladene er små, blanke og mørkegrønne; nye skud er rødlige til kobberrøde, før de bliver grønne – især når planten står lyst. Om sommeren kommer hvide blomster med mange lange støvdragere som hos myrte, og bagefter ægformede, purpurrøde frugter. En særhed er, at et enkelt frø ofte rummer flere kim, så der kan komme flere kimplanter op af samme frø. Den kraftige vækst og den gode tolerance over for beskæring gør arten velegnet til bonsai.

Formering

Frøene kan sås inde hele året; bedst om foråret eller efteråret. De tåler dårligt at tørre ud og bør sås hurtigt. Læg dem i lunkent vand natten over – det blødgør skallen – og så dem derefter ca. 1 cm dybt i fugtig såjord eller kokos-såmuld med lidt afstand imellem. Stil såbakken lyst og lunt, og hold dyrkningsmediet jævnt fugtigt, men ikke vådt. Kimplanterne viser sig normalt efter nogle uger; ikke alle frø spirer. Kommer der flere kimplanter op af samme frø, kan de skilles forsigtigt, når de har fået de første rigtige blade og prikles ud i enkelte potter med priklejord.

Sikkerhed: Frø, næringsstoffer og dyrkningsmedier er ikke beregnet til at spise – hverken for mennesker eller dyr. Nogle arter er giftige, så opbevar dem utilgængeligt for børn og dyr.

Placering og lys

Australsk buskkirsebær vil have lyst til solrigt. Fra midten af maj, når der ikke længere er risiko for nattefrost, til slutningen af september står det bedst ude et lyst sted; på varme dage skærmes det for den skarpeste middagssol, så rodklumpen ikke tørrer ud. Står det for mørkt, mister de nye skud deres rødlige farve.

Vanding og næringsstoffer

Træet vokser kraftigt og har et stort vandforbrug: Vand rigeligt i vækstsæsonen, men lad dyrkningsmediet tørre let i overfladen før næste vanding. Om vinteren vandes mere sparsomt. Når luften inde er tør, overbruses bladene en gang imellem med rent regnvand i stuetemperatur. Fra april til september gives flydende bonsai-næring hver 4. uge.

Dyrkningsmedie

Færdig bonsai-jord er et godt valg. Til unge planter passer priklejord med kvartssand. Rødderne vokser kraftigt, så unge planter omplantes hvert 2. år om foråret, og samtidig beskæres rødderne.

Beskæring

Australsk buskkirsebær tåler beskæring godt og kan beskæres hele året. Bladene sidder parvis: Når et skud har dannet 3–4 bladpar, skæres det tilbage til 1–2 bladpar. Fjern skud, der vokser ind i kronen eller ud af formen, og tynd kronen ud, så den forbliver lys og åben. Blomsterne kommer på korte, forveddede skud – vil du have blomster, så lad nogle af dem sidde.

Vinteropbevaring

I en skål tåler australsk buskkirsebær ikke frost. Tag træet ind, før nattetemperaturen falder under ca. 5 °C, og stil det så lyst som muligt ved ca. 10–15 °C. Undgå træk og store temperaturudsving. Vand sparsomt, så dyrkningsmediet ikke tørrer helt ud, og giv ingen næring. Fra midten af maj kan det igen stå ude.

Vigtige dyrkningstips

Det meste, der går galt ved såning, skyldes for meget vand eller for lidt lys. Jeg anbefaler et let, næringsfattigt såmedie som såjord eller kokos-såmuld, så de fine rødder ikke rådner. Når kimplanterne skal prikles, giver priklejord med kvartssand god dræning og et stabilt rodnet. Senere, når træet skal formes som bonsai, er min færdigblandede bonsai-jord et godt grundlag. Hav tålmodighed: Frø fra samme pose spirer ikke altid samtidig, så lad såbakken stå, selvom de første kimplanter allerede er kommet op.